

RU Полипы желчного пузыря: видим чаще — вопросов больше

Н. В. Ширинская¹, Н. В. Калятина¹, А. В. Ширинская²

¹Медицинский лечебно-диагностический центр «Доверие», Омск, Россия

²Омский государственный медицинский университет, Омск, Россия

Ключевые слова: желчный пузырь, полипы желчного пузыря, проспективное клиническое исследование, аденокарцинома желчного пузыря

Актуальность. Полипы желчного пузыря в последнее время все чаще встречаются в практике врачей-терапевтов и гастроэнтерологов в связи с улучшением инструментальной визуализации органов брюшной полости.

Цель исследования: проанализировать динамику развития полипов желчного пузыря на амбулаторном приеме врача-терапевта (гастроэнтеролога).

Материалы и методы. Проведено проспективное клиническое пятилетнее исследование, в котором приняли участие пациенты с полипами желчного пузыря. Всем больным проводилось ультразвуковое исследование органов брюшной полости (аппарат «Voluson E10») раз в полгода на протяжении пяти лет. В динамике наблюдения оценивали количество и характер роста полипов, размер желчного пузыря, наличие/отсутствие жалоб, отягощенного по неопластическим заболеваниям анамнеза. Полученные данные подвергали стандартной статистической обработке.

Результаты. В исследование включены 33 пациента (14 мужчин, 19 женщин в возрасте 24–65 лет, средний возраст $45,19 \pm 1,73$ года). При инициальном ультразвуковом исследовании количество визуализируемых полипов варьировало от 1 до 5 (в среднем — $2,09 \pm 0,95$), размер новообразований составлял от 2 мм до 10 мм (в среднем — $5,75 \pm 1,10$ мм). Отягощенная наследствен-

ность по онкопатологии отмечена у 42,86% мужчин и 31,58% женщин. Полипы без ножки чаще диагностировали у мужчин (14,29%), тогда как у женщин чаще регистрировали увеличение полипов в размерах в динамике наблюдения >10 мм и более высокую частоту выполнения оперативных вмешательств (холестистэктомии).

Выводы. Отмечена склонность к медленному росту полипов желчного пузыря. Обозначены вопросы, возникающие при ведении пациентов с полипами желчного пузыря, с точки зрения выбора оптимальной тактики ведения и оперативного лечения ввиду возможной малигнизации данных образований.

УДК 616.366.006.5-08.035

doi: 10.33149/vkr.2020.03.11

UA Поліпи жовчного міхура: бачимо частіше — питань більше

Н. В. Ширинська¹, Н. В. Калятіна¹,
А. В. Ширинська²

¹Медицинський лікувально-діагностичний центр «Довіра», Омськ, Росія

²Омський державний медичний університет, Омськ, Росія

Ключові слова: жовчний міхур, поліпи жовчного міхура, проспективне клінічне дослідження, аденокарцинома жовчного міхура

Актуальність. Поліпи жовчного міхура останнім часом все частіше зустрічаються у практиці лікарів-терапевтів і гастроентерологів у зв'язку з поліпшенням інструментальної візуалізації органів черевної порожнини.

Мета дослідження: проаналізувати динаміку розвитку поліпів жовчного міхура на амбулаторному прийомі лікаря-терапевта (гастроентеролога).

Матеріали і методи. Проведено проспективне клінічне п'ятирічне дослідження, у якому взяли участь пацієнти з поліпами жовчного міхура. Всім хворим проводили ультразвукове дослідження органів черевної по-